

FOURMIDOR®

Hotová gélová insekticídna návnada proti mravcom pre profesionálnu aplikáciu v obytných a obchodných priestoroch a ich okolí.

Účinná látka:

fipronil 0,05%, tj. 0,5 g/kg

tj. (+-)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro-methylsulfinylpyrazol -3-karbonitril

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: fipronil CAS No.: 120068-37-3

UPOZORNENIE!

Výstražné upozornenie:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Tel.č.: +421-2-58 266 111

Výrobca:

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, Švajčiarsko

Registračné číslo:

Dátum výroby:	uvedené na obale
Číslo šarže:	uvedené na obale
Balenie:	6 x 10 fľaštičiek po 50 g prípravku

Fourmidor® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

Návod na použitie

Fourmidor® je účinný hlavne proti mravcom z podčeľade Formicinae ako preventívny a nápravný prostriedok.

Druhy: Pre kontrolu mravcov vrátane Mravcov obyčajných (*Lasius niger*) a Argentínskych mravcov (*Linepithema humile*).

Fourmidor® je pripravený na priame použitie, je to insekticídna gélová návnada obsahujúca 0,5 g/kg (0,05%) účinnej látky Fipronil, pre kontrolu mravcov v domácnosti a v okolí domácností a obchodných

priestorov určený pre profesionálne použitie. Fourmidor® pôsobí pri kontakte a prostredníctvom prehltnutia už pri veľmi nízkych dávkach. Mravce priťahuje sladký gél. Prehltnú gél s účinnou látkou a vezmú ho naspäť do mraveniska, aby nakŕmili vyľahnuté mravce. Mravce uhynú v mravenisku niekoľko hodín po užití gélu. Produkt sa dodáva vo fľašiach alebo v tubách. Obal výrobku Fourmidor® je navrhnutý tak, aby sa dal gél jednoducho aplikovať do prasklín a škár.

Fourmidor® by sa mal na týchto miestach aplikovať vo forme malých kvapiek. Tieto kvapôčky gélu sa majú aplikovať pozdĺž cestičiek mravcov vo vzdialenosti približne 30 cm a mali by byť chránené pred dažďom (napr. strešnou škridlou). Jedna kvapka má priemer približne 3-4 mm a hmotnosť asi 0,03 g. Oblasť použitia sa má skontrolovať o 1-2 týždne neskôr. Ak bola gélová návnada úplne spotrebovaná a stále badať pohyb mravcov, je potrebné aplikovať druhú dávku. Fourmidor® sa nesmie nanášať na povrchy, ktoré by mohli byť zaplavené vodou, alebo z ktorých by mohol byť odstránený bežným čistením. Nenanášajte sprejom na Fourmidor® alebo v jeho okolí žiadne iné insekticídy a taktiež neaplikujte gél v miestach kde boli nedávno takéto látky použité, pretože priťahovanie mravcov ku gélu by mohlo byť negatívne ovplyvnené.

Aplikačná dávka a návod na použitie:

Oblasť použitia	Spôsob aplikácie	Doba aplikácie
V obytných a komerčných budovách a v ich okolí	1 kvapka na každých 30 cm chodníčkov mravcov	Čo najskôr po tom, ako mravce začnú byť aktívne.

Oblasť použitia: V domácnosti a v okolí domácností a obchodných priestorov

Aplikačná dávka: 1 kvapka každých 30 cm v blízkosti chodníčkov mravcov

Doba aplikácie: Hneď ako badáte aktivitu mravcov.

Vnútrore použítie: Umiestnite kvapky na rovný, neabsorpčný povrch ľahko prístupný pre mravce, napr. dlažba alebo kameň, NEUMIESTŇUJTE na absorpčný povrch ako je pôda alebo drevo. Fourmidor® je najúčinnější ak sa aplikuje pozdĺž mravčích chodníčkov. Aplikujte 1 kvapku každých 30 cm pozdĺž mravčích chodníčkov hneď ako spozorujete aktivitu mravcov. Jedna kvapka má priemer približne 3-4 mm a hmotnosť asi 0,03 g. Takto ošetrované povrchy sa majú skontrolovať o 1-2 týždne neskôr. Ak bola gélová návnada úplne spotrebovaná a stále badať pohyb mravcov, je potrebné aplikovať druhú dávku. Nenanášajte sprejom na Fourmidor® alebo v jeho okolí žiadne iné insekticídy a taktiež neaplikujte gél v miestach kde boli nedávno takéto látky použité, pretože priťahovanie mravcov ku gélu by mohlo byť negatívne ovplyvnené.

Vonkajšie použítie: Mraveniská sa často nachádzajú pod chodníkmi, pod dlažbou alebo pod stenami, ktoré poskytujú kolónii špeciálnu ochranu. Fourmidor® je najúčinnější ak sa aplikuje pozdĺž mravčích chodníčkov. Aby ste dosiahli s prípravkom Fourmidor® najlepšie výsledky, je potrebné pred aplikáciou gélu odstrániť alternatívne zdroje jedla pre mravcov (hlavne zdroje cukru, zvyšky jedál, a pod.). Jedlo a odpadky obsahujúce jedlo odvracajú pozornosť mravcov od gélovej návnady.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci používajte ochranu tela na základe aktivity a možnej expozície, zásteru, ochranné čizmy, chemický ochranný oblek, ochranné okuliare s bočnými štítmami a ochranné rukavice odolné voči chemikáliám. Po práci si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa s potravinami pracuje. Aplikujte na miesta, kde nástraha nebude dosiahnuteľná pre deti.

Prvá pomoc

Po náhodnom požití: vypláchnite si ústa a potom vypite veľké množstvo vody.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pokoj a pobyt na čistom vzduchu.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. **02/54 77 41 66**).

Skladovanie:

Skladujte v suchých, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, liekov a chemických látok (vrátane obalov), pri teplotách do 35 °C. Prípravok nesmie zmrznúť.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 36 mesiacov od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov:

Prázdne obaly (tuby od pasty) po vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do separovaného komunálneho odpadu.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.